



İLAÇLAMA SIRASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- 1- Kimyasal mücadelede ilaçlama *Uygulayıcı Yetki Belgesine* sahip kişilerce tarafından yapılmalıdır.
- 2-İlaç etiketleri çok iyi okunmalıdır.
- 3-Önerilen doza mutlaka uyulmalıdır.
- 4-Etiketlerde yazılı kültür bitkisinden başkasına kesinlikle kullanılmamalıdır.
- 5-ilaçlamalar günün serin saatlerinde yapılmalıdır.
- 6-Eldiven, maske ve koruyucu elbise giyilmelidir.
- 7-Uygun alet ve donanım seçilmelidir.
- 8-ilaçlama esnasında hiçbir şey yenilip içilmemelidir.
- 9-ilaç etiketi üzerinde yazılı son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye mutlaka uyulmalı, zamanından önce hasat edilmemelidir.

SEBZE FİDELERİNDE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ



Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı
Şube Müdürlüğü

No: B/22
2018



SAMSUN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

<http://samsun.tarimorman.gov.tr>

E-Posta : samsun@tarimorman.gov.tr

Kılıçdede Mah. Abdülhakhamit Cad. No:5 55060 İlkadım/SAMSUN

Telefon : 0362 2313700 (3 Hat) Faks : 0362 2332163



SAMSUN
İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ



SEBZE FIDELERİNDE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ (ÇÖKERTEN)

Fide devresinde görülen bir hastalıktır. Çıkıştan önce de zarar meydana gelebilir. Fidelik devresinde fidelerin toprakla temas eden kök boğazlarından itibaren yattıkları görülür.



Gerek çıkış öncesi gerek sonrası meydana gelen ölümler sonucu fidelikte ocaklar halinde boşluklar meydana gelir. Fidelik koşulları uygun olduğu takdirde, hastalık fidelerin tamamının tahrip olmasına sebep olabilir. Tüm sebze çeşitlerinin fidelik devresinde zararlıdır. Etmeni birden fazla fungus olup, genellikle toprak menşelidir. Bir kısım etmen tohumla da bulaşabilir.



MÜCADELESİ:

Kültürel Önlemler:

Zarar görülen fideliklerin toprağı değiştirilmeli, Tohum çok sık ekilmemeli, Hastalıklı fideler ayıklanmalı, fideler uygun hava koşullarında açılıp sık sık havalandırılmalı, Fazla sulamadan kaçınılmalıdır. Gereksiz yere fazla azotlu gübre verilmemeli, erken ekim yapmaktan kaçınılmalı, fidelikler bol güneş alan, soğuk rüzgârları tutmayan yerlerde kurulmalıdır.

Kimyasal Mücadele:

İlaçlamalar, tohum ilaçlaması, toprak ilaçlaması (ekimden önce, ekimden sonra) ve fidelerin toprak yüzüne çıkışından sonra yapılabilir.

Toprak İlaçlaması (ekimden önce):

Fidelik toprağını en yakın İl/İlçe Gıda Tarım ve



Hayvancılık Müdürlüğü Teknik personelin tavsiye edeceği şekilde ilaçlama yapılmalıdır. Küçük yerlerde kaynar su ile de toprak dezenfeksiyonu yapılabilir.

Tohum İlaçlaması:

İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Teknik personelin tavsiye edeceği şekilde ilaçlama yapılmalıdır.

Fideler Toprak Yüzüne Çıktıktan Sonra:

Fidelikte hastalık görüldüğü takdirde listedeki ilaçlardan biri ile ilaçlama yapılır. Hastalık duruncaya kadar (gerekliğinde 2-3 ilaçlama) haftada bir verilebilir, her ilaçlamanın arkasından da temiz su ve bahçe süzgeciyle sulama yapılmalıdır. İlaçlamalara rağmen fidelerde çökerten meydana gelmesi halinde, hastalıklı fideler sökülüp, temizlenmeli, yerlerine 1 cm. kalınlığında sönmemiş kireç+kum karışımı, konulup, üzerine su verilmelidir.

Kullanılacak İlaçlar ve Dozları:

Üretici Kayıt Defteri ile birlikte en yakın Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüğüne veya reçete yazma yetkisi olan Ziraat Mühendislerine başvurularak mücadele yöntemleri hakkında bilgi alınmalı ve tavsiye edilecek Bitki Koruma Ürünleri reçete ettirilmelidir.